

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DOME, HAUTE-VIENNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Cité Administrative, rue Pélissier, 63034 Clermont Ferrand Cedex

Téléphone (73) 92-42-68 - Poste 477

DLP 12-5-81698708

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

ABONNEMENT ANNUEL :

70,00 F

Régie de Recettes de la D.D.A.
Sous-Régisseur de Recettes
du Service de la Protection
des Végétaux
Cité Administrative - Rue Pelissier
63034 Clermont Ferrand Cedex
C. C. P. Clermont-Ferrand 5.503-17

BULLETIN du 6 MAI (Édition générale 1981 - n° 12)

n° 187

ARBRES FRUITIERS A PEPINS

TAVELURE du POMMIER et du POIRIER.-

devenir insuffisante.

12 Mai.

La protection assurée par le dernier traitement va

Une nouvelle application est conseillée avant le

OÏDIUM du POMMIER.-

Intervenir en même temps contre ce champignon.

ACARIEN ROUGE.-

Surveiller l'évolution de ces ravageurs.

Après la floraison, les acaricides spécifiques suivants

peuvent être utilisés :

Azocyclotin (PEROPRAL)

Benzoximate (ARTABAN)

Chinomethionate (MORESTAN)

Dicofol + Fenizon (OXFOR)

Chlorofenizon (TRICHLORFENSON OVITOX)

Propargite (OMITE)

Fenizon (TRIFENSON OVICIDE SEPPIC)

Fenizon + Dioxathion (OVICAR S).

PSYLLE du POIRIER.-

La situation est saine dans l'ensemble.

doit être effectuée.

Aucune intervention spécifique contre ce ravageur ne

GRANDES CULTURES

CEREALES.-

. Rhynchosporiose de l'orge

Cette maladie est présente dans de nombreuses parcelles des régions des départements de l'ALLIER, du PUY-DE-DOME, de la CREUSE et de la HAUTE-VIENNE.

Si la présence de taches est constatée sur les dernières feuilles, un traitement sera à effectuer à l'épiaison.

P.1.1.17

. Septoriose (blé)

Les premiers symptômes sont visibles sur ARMINDA et LUTIN (régions de COGNAT-LYONNE et d'EBREUIL - Allier, et de BOUSSAC - Creuse).

Cette maladie se manifeste toujours dans plusieurs parcelles du département de la Haute-Vienne (régions citées dans le précédent bulletin).

Suivre l'évolution de ce champignon et intervenir en cas de progression.

. Oïdium (blé - orge)

Cette maladie est présente dans quelques parcelles région d'EBREUIL (Allier) et de MOUREUILLE (Puy-de-Dôme) ainsi qu'en Haute-Vienne.

Attendre l'épiaison pour intervenir.

BETTERAVES ET TOURNESOL.

Des attaques de vers gris sont signalées dans quelques parcelles de la région de GANNAT (Allier).

Il est conseillé aux agriculteurs de visiter leurs semis et d'intervenir dès les premiers dégâts.

. Utiliser des appâts confectionnés avec du son à base de : lindane (4 g de matière active par kg de son), d'endosulfan (2 g de matière active par kg de son), d'acéphate (2, 4 g de matière active par kg de son).

. Deux produits autorisés à la vente peuvent être utilisés en pulvérisation sur la base 500 l/ha, l'acéphate (ORTHENE) à 900 g de matière active/ha et la cyperméthrine (RIPCORN) à 30 g de matière active/ha.

M A I S .-

. Pyrale

La pyrale du maïs a nettement progressé vers le Sud dans le département du Puy-de-Dôme en 1980.

De nombreux sondages (comptages de chenilles dans les tiges) ont été réalisés à l'automne dernier afin de déterminer l'importance de la progression et de délimiter les zones qui devront être traitées en 1981.


Cette prospection et l'élaboration de la carte ci-jointe, ont été réalisées en collaboration avec les Ets MAICENTRE et LIMAGRAIN.

Les avis de traitements seront diffusés le moment venu dans nos bulletins.

Le Chef de la Circonscription
Phytophytaire,

A. FARGEIX.

N° d'inscription à la C.P.P.A.P. : 525 AD.



MAÏCENTRE - S.P.V. - LIMAGRAIN

----- limite de zone traitée en 1980

Situation automne 1980


Zônes à traiter en 1981

plus de 0,7 chenille par pied



traitements impératifs


0,4 à 0,7 chenille par pied



traitements conseillés

P118

0,2 à 0,4 chenille par pied



traitements à envisager uniquement
en maïs-semences